

16.02.2010

■ sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos
Kliinisen mikrobiologian laboratorio

OHJE CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOKSIINI -NÄYTTEEN OTTAMISEEN (F-CldiTox)

Tutkimuksen tarkoitus:

Antibioottiripulin syyn selvitys. Epäily Clostridium difficile –bakteerin aiheuttamasta ripulista.

Näytteenoton ajoitus:

Ajoittakaa näytteenotto siten, että voitte toimittaa näytteen samana päivänä laboratorioon.

Tutkimuksen tarvikkeet:

Kertakäyttömuki tai kertakäyttölautanen, näytteenottopurkki, nimitarra ja muovipussi

Näytteenotto:

1. Ulostakaa puhtaaseen kertakäyttöastiaan.
2. Avatkaa näytteenottopurkki ja siirtäkää ulostetta purkkiin vähintään puoli purkillista. Näytteeksi tarvitaan löysää ulostetta. Kova nokare ei sovi tutkimukseen.
3. Sulkekaa purkki huolellisesti. Ulostetta ei saa jäädä purkin ulkopuolelle.
4. Tarkistakaa tarran henkilötiedot. Merkitkää näytteenottopäivämäärä kynällä tarraan. Liimatkaa tarra purkkiin.
5. Sulkekaa purkki huolellisesti muovipussiin.
6. Viekää näyte laboratorioon mahdollisimman pian.

Näytteen säilyttäminen:

Säilyttäkää näyte jääkaapissa, kunnes voitte toimittaa sen laboratorioon.