

16.02.2010

■ sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos
Kliinisen mikrobiologian laboratorio

OHJE CLOSTRIDIUM DIFFICILE VILJELY -NÄYTTEEN OTTAMISEEN (F-CldiVi)

Tutkimuksen tarkoitus:

Antibioottiripulin syyn selvitys. Epäily Clostridium difficile –bakteerin aiheuttamasta ripulista.

Näytteenoton ajoitus:

Ajoittakaa näytteenotto siten, että voitte toimittaa näytteen samana päivänä laboratorioon.

Tutkimuksen tarvikkeet:

Kertakäyttömuki tai kertakäyttölautanen, näytteenottotikku ja geeliä sisältävä kuljetusputki, nimitarra ja muovipussi

Näytteenotto:

1. Ulostakaa puhtaaseen kertakäyttöastiaan.
2. Avatkaa vanutikun ja kuljetusputken suojakääre ja poistakaa kuljetusputken suojakorkki. Suojakorkkia ei tämän jälkeen enää tarvita.
3. Imeyttäkää vanutikkuun runsaasti ulostetta. Mikäli ulosteessa on verisiä ja/tai limaisia kohtia, tulee näyte ottaa ensisijaisesti niistä.
4. Painakaa vanutikku kuljetusputkeen niin syväälle, että tikussa oleva korkki sulkee putken luotettavasti. Ulostetta ei saa jäädä putken ulkopuolelle.
5. Tarkistakaa tarran henkilötiedot. Merkitkää näytteenottopäivämäärä kynällä tarraan. Liimatkaa tarra putkeen.
6. Sulkekaa putki huolellisesti muovipussiin.
7. Viekää näyte laboratorioon mahdollisimman pian.

Näytteen säilyttäminen:

Säilyttäkää näyte jääkaapissa, kunnes voitte toimittaa sen laboratorioon.