

16.02.2010

■ sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos
Kliinisen mikrobiologian laboratorio

OHJE HELICOBACTER PYLORI ANTIGEENI -ULOSTENÄYTTEEN OTTAMISEEN (F-HepyAg)

Tutkimuksen tarkoitus:

Tutkimuksella selvitetään, onko kyseessä Helicobacter pylori -infektio tai onko jo todetun infektion lääkehoito eli ns. häätöhoito tehonnut.

Näytteenoton ajoitus:

- Ajoittakaa näytteenotto siten, että voitte toimittaa näytteen samana päivänä laboratorioon.
- Testi ei toimi ripuliulosteesta.
- Ennen näytteenottoa tulee seuraavien lääkkeiden ottamisesta olla kulunut vähintään kaksi (2) viikkoa:
 - Kaikki antibiootit
 - Protonipumpun estäjät (Gasterix, Lansoprazol, Lanzo, Zolt, Losec, Omeprazol, Nexium, Pariet, Pantoprazol, Somac)
 - Vismuttivalmisteet (Pylorid)
- Mikäli näyte otetaan häätöhoidon jälkeen, pitää hoitolääkityksestä olla kulunut vähintään neljä (4) viikkoa.
- Dieettirajoituksia ei ole.

Tarvikkeet:

Kertakäyttömuki tai kertakäyttölautanen, näytteenottopurkki, nimitarra ja pussi

Näytteenotto:

1. Ulostakaa puhtaaseen kertakäyttöastiaan. Vetinen ripuliuloste ei sovi näytteeksi.
2. Avatkaa näytteenottopurkki ja siirtäkää ulostetta purkkiin reilun kokoinen nokare.
3. Sulkekaa purkki huolellisesti. Ulostetta ei saa jäädä purkin ulkopuolelle.
4. Tarkistakaa tarran henkilötiedot. Merkitkää näytteenottopäivämäärä kynällä tarraan. Liimatkaa tarra purkkiin.
5. Sulkekaa purkki huolellisesti muovipussiin.
6. Viekää näyte laboratorioon samana päivänä. Säilyttäkää näyte jääkaapissa, kunnes voitte toimittaa sen laboratorioon.